































LES ARBRES

| | NOM | FLORAISON | FEUILLAGE | FRUCTIFICATION | REMARQUES |
|--|---|---|--|--|--|
|  | Alisier blanc <i>Sorbus aria</i> Arbre, 6-12 m | Mai  | Feuille blanche grisâtre coloration automnale de jaune à brun, défeuillaison tardive | rouge orange septembre | Plein soleil Croissance faible Rustique, résistant à la pollution Arbre ornemental, particulièrement lorsqu'il est planté isolé ou en alignement |
|  | Alisier torminal ou Alisier commun <i>Sorbus torminalis</i> Arbre, 10-15 m | Blanche, mai  | coloration automnale de jaune à rouge | ovoïde, brun septembre - octobre | Mi-ombre à plein soleil Isolés, en alignement ou en haie brise-vent De préférence en sol calcaire et en situation chaude |
|  | Aulne glutineux <i>Alnus glutinosa</i> Arbre, 15-20 m | Chaton jaune au printemps février - avril |  | petit cône globuleux persistant en hiver septembre - octobre | Plein soleil à mi-ombre croissance forte, Recépé, cet arbre de berge, devient touffu et forme de belles haies. Ses racines fixent l'azote et maintiennent les sols détrempés. En terrain humide et assez riche Bas ou mi berge |
|  | Bouleau verruqueux <i>Betula pendula</i> Arbre, 25 m | chaton avril - mai | feuillage léger, vert clair - vert foncé, coloration automnale jaune  | petit cône sec allongé juin – août  | Plein soleil, croissance forte Belle écorce blanche argentée, cet arbre fera des merveilles dans un taillis (il rejette abondamment), isolé ou dans un alignement. En sol pauvre, bien drainé. |
|  | Cerisier à grappes <i>Prunus padus</i> Arbre, 15 m, | Belle floraison blanche en grappe, odorante avril - juin | coloration automnale de jaune à orange | grappe pendante à drupes globuleuses, noires juillet – août | Plein soleil à mi-ombre Croissance forte accepte les sols humides, sous-bois, haies, bords de ruisseaux |








| | NOM | FLORAISON | FEUILLAGE | | FRUCTIFICATION | REMARQUES |
|--|--|---|---|--|--|---|
|  | Charme <i>Carpinus betulus</i> Arbre, 20-25 m | chaton avril - mai | Marcescent (les feuilles restent sur l'arbre l'hiver), coloration feuillage doré en hiver | | ailé en grappes septembre – octobre | Mi-ombre croissance faible, supporte parfaitement la taille, excellent pour les haies, utilisé en ornement (haie de charmille). En sol ni trop acide, ni trop humide |
|  | Chêne pédonculé <i>Quercus robur</i> Arbre, 25-35 m | chaton avril - mai | Marcescent couvert léger, coloration automnale orange | | Gland | Plein soleil Croissance forte, Résistant aux vents Ce chêne peut être planté en haie ou en alignement. Mais c'est isolé qu'il se développe son port majestueux. En terrain assez lourd, riche et frais |
|  | Erable champêtre <i>Acer campestre</i> Arbre, 15-20 m | vert jaunâtre. avril/mai | petites feuilles vert clair, coloration automnale jaunâtre couvert épais | | samare septembre | Plein soleil. Croissance forte Installé en taillis ou en haie, (libre ou taillée), l'érable séduit par la teinte dorée de son feuillage automnal. En tout sol, non acide et surtout en exposition ensoleillée Sommet de berge |
|  | Erable plane <i>Acer platanoides</i> Arbre, 20-30 m | jaune verdâtre, avant les feuilles, avril - mai |  | vert clair coloration automnale jaune orange brillant | samare | Plein soleil à mi-ombre Croissance forte Superbe. Planté isolé ou en alignement ; en terrain frais. |
|  | Erable sycomore <i>Acer pseudoplatanus</i> Arbre, 20-30 m | vert jaunâtre en grappes mai vert foncé | coloration automnale jaune orange avec des panachures rougeâtres | | samare | Plein soleil à mi-ombre Croissance forte Pour les alignements ou isolés dans un jardin. Préfère les sols frais à humides Sommet de berge |



| | NOM | FLORAISON | FEUILLAGE | FRUCTIFICATION | REMARQUES |
|---|---|---|---|--|---|
|  | Frêne commun <i>Fraxinus excelsior</i> Arbre, 5-40 m | brunâtre, avant les feuilles avril | foliation tardive coloration automnale tardive, tombe tardivement | samare pendante, persistante en hiver septembre | Plein soleil Croissance forte, résistant aux vents, Isolé, en bosquet, en alignement, le frêne s'apprécie pour son feuillage léger qui joue avec le vent Eviter les sols secs. Mi-berge |
|  | Hêtre <i>Fagus sylvatica</i> Arbre, 40 m | chaton globuleux avril - mai | couvert épais coloration automnale jaune marcescent  | faine octobre | Mi-ombre à plein soleil Croissance faible. En haie brise-vent, isolé dans le jardin, le feuillage marcescent du hêtre bruisse au vent tout au long de l'année quand il est taillé bas. Crée beaucoup d'ombre |
|  | Merisier <i>Prunus avium</i> Arbre, 12-15 m | grande, blanche avril - mai | coloration automnale de rouge à orange  | merise rouge ou noirâtre comestible en été juin - juillet | Ce fruitier sauvage offre une floraison odorante et blanche, de délicieuses merises et un magnifique feuillage automnal. A installer dans une haie, un bosquet ou en isolé. De préférence en sol fertile, profond et humide. Sommet de berge |
|  | Peuplier tremble <i>Populus tremula</i> Arbre, 10-30 m | chaton avant les feuilles mars - avril | foliation tardive très mobile, fait du bruit, vert grisâtre | capsule à graines cotonneuses | Plein soleil à mi-ombre Croissance forte Planté isolé, près de la maison, le tremble fait merveille : ses feuilles frémissent au moindre souffle et s'enflamment de couleurs vives en l'automne. Partout mais de préférence en sol frais et lourd. Eviter les berges |
| | Poirier sauvage <i>Pyrus pyraster</i> Arbre, 10-20 m | grande, blanche avril - mai | coloration automnale de jaune à orange | petite poire septembre | Plein soleil, croissance forte Joli port, floraison printanière blanche, fruits faisant le plaisir des oiseaux et des cuisiniers curieux... Ce poirier s'installe dans les haies, de préférence au sud. En terrain bien drainé. Sommet de berge |
| | Pommier sauvage <i>Malus sylvestris</i> Arbre, 10 m | blanche et rose avril - mai | | petite pomme, jaune verdâtre septembre - octobre | Plein soleil, mi-ombre Croissance forte Fleurs et fruits décoratifs, buissonnant, il est parfait dans un petit jardin. Mi ou sommet de berge |






| | NOM | FLORAISON | FEUILLAGE | FRUCTIFICATION | REMARQUES |
|--|--|---|---|--|--|
|  | Saule blanc <i>Salix alba</i> Arbre, 15-20m | chatons (pieds mâles) mars - avril | Feuille au revers argenté. feuillage léger  | capsule mai - juin | Plein soleil à mi-ombre Croissance forte En têtard ou recépé. Fixe la terre. En sol humide. Bas ou mi berge |
| | Saule marsault <i>Salix caprea</i> Arbre, 2-10 m | | | | Plein soleil à mi-ombre Croissance rapide, Rustique. En sol très frais et à exposition lumineuse. Bas ou mi berge |
|  | Saule marsault <i>Salix caprea</i> Arbre, 2-10 m | Chaton avant les feuilles, mars – avril  | vert clair feuillage léger | capsule mai - juin | Plein soleil à mi-ombre Croissance rapide, Rustique. En sol très frais et à exposition lumineuse. Bas ou mi berge |
| | Saule pourpre <i>Salix purpurea</i> Arbuste, 1-4 m | | | | Plein soleil Croissance forte En bord de cours d'eau, plante cultivée comme osier. Bas ou mi berge |
|  | Saule des vanniers <i>Salix viminalis</i> Arbre, 2-10m | chaton avant les feuilles avril - mai | feuillage léger argenté, jaune-orangé en hiver | capsule mai - juin | Plein soleil, mi-ombre Croissance forte, plante mellifère Avec ses racines fixant le sol, cet arbre compose haies et brise-vent. Bas ou mi berge |
|  | Sorbier des oiseleurs <i>Sorbus aucuparia</i> Arbre 9 m | blanche mai - juin | coloration automnale de jaune orange à rouge orange | petit, rouge vif, persistant l'hiver septembre | Plein soleil, croissance forte Rustique, ce sorbier est très décoratif par ses grappes de baies rouges qui persistent jusqu'au cœur de l'hiver et qui sont le régal des grives en automne. A planter isolé ou en alignement. En tout sol. |



| | NOM | FLORAISON | FEUILLAGE | FRUCTIFICATION | REMARQUES |
|--|---|---------------------------------|--|--|---|
| | Sorbier domestique <i>Sorbus domestica</i> Arbre 5-30 m | | Feuillage découpé | Cormes : fruits comestibles blettes. confiture et eau-de-vie. Octobre | Recommandé comme sujet isolé dans le jardin, en situation chaude. De préférence en sol calcaire. |
|  | Tilleul à grandes feuilles <i>Tilia platyphyllos</i> Arbre, 30 m | très odorante juin - juillet | couvert épais coloration automnale jaunâtre  | capsule octobre | Plein soleil Croissance forte En alignement, isolé, dans la haie (lorsqu'il est recépé). Comment se passer du tilleul, de sa floraison parfumée, de son ombrage doux ? Supporte de nombreux sols (même calcaires et lourds) Sommet de berge |

LES ARBUSTES

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
|  | Bourdaine <i>Frangula alnus</i> Arbuste, 1-5 m | blanche verdâtre mai | vert mat | petite baie rouge puis noire à maturité août | Plein soleil à mi-ombre mellifère. S'installe dans une haie ou au bord de l'eau. Terrains peu calcaires, lourds, assez frais, voire humides. Mi berge |
|  | Cornouiller mâle <i>Cornus mas</i> Arbuste, 1-8 m | Floraison jaune d'or en mars  | coloration automnale jaune à jaune brun | Baie rouge foncé (les cornouilles), comestible à maturité septembre | Mi-ombre à plein soleil Croissance faible Mellifère A découvrir : isolé, en taillis ou en haie, cet arbuste se couvre d'une spectaculaire floraison hivernale. |
|  | Cornouiller sanguin <i>Cornus sanguinea</i> Arbrisseau, 1-4 m | Blanche, parfumée, mai/juin  | coloration automnale rouge | petite baie noire toxique septembre - octobre | Plein soleil. Mellifère, croissance forte. Ses rameaux font merveilles dans les haies et massifs. En sols calcaires de préférence. Mi ou sommet de berge |
|  | Eglantier commun Rosier des chiens <i>Rosa canina</i> Arbrisseau, 3-5 m | Blanche ou rose odorante mai - juin | | Baie rouge comestible  | Lumière Arbustes qui reste longtemps décoratif Epines (utilisée pour les haies défensives), croissance forte |

| | NOM | FLORAISON | FEUILLAGE | FRUICTIFICATION | REMARQUES |
|--|---|--|---------------------------------------|--|--|
| | Faux pistachier <i>Staphylea pinnata</i> Arbuste 5 m | Fleurs blanches et roses de mai à juillet | | Fruits toxiques | Plein soleil à mi-ombre Croissance forte Pour orner massifs et haies |
| | Framboisier <i>Rubus idaeus</i> Arbuste, 0.6-1.5 m | blanche ou verdâtre mai -août | | framboise juillet - septembre | Plein soleil Croissance rapide Pour une haie gourmande... |
|  | Fusain d'Europe <i>Evonymus europaeus</i> Arbuste, 3-7 m | blanc verdâtre avril – juin  | vert foncé, pourpre orangé en automne | bonnet d'évêque, rouge-orangé en septembre - octobre | Plein soleil à mi-ombre Croissance forte Spectaculaire en automne avec son feuillage flamboyant, ses typiques fruits fuschia. Le fusain est parfait en haie ou bosquet. A tailler sévèrement à la plantation pour qu'il se ramifie bien. Bas ou mi berge |
| | Genévrier commun <i>Juniperus communis</i> Arbuste 2-8 m | Avril à mai | | | Plein soleil Croissance faible Parfait sur les talus rocaillieux ou dans la haie En terrain bien drainé. |
| | Groseillier à maquereau <i>Ribes uva-crispa</i> Arbuste, 0.6-1.2 m | rouge et verdâtre mars - avril | | grosse baie juin – août comestibles | Pein soleil à mi-ombre Croissance moyenne mellifère épines (utilisation en haie défensive) Utilisation des fruits Terrain argileux, peu acide |
| | Groseillier rouge <i>Ribes rubrum</i> Arbuste, 0.6-1.5 m | en grappes, blanche mars - avril | | baie rouge juin – août comestibles | Mi-ombre à plein soleil Croissance faible Mellifère Dans les massifs et le potager, en clôture gourmande. |
| | Houx <i>Ilex aquifolium</i> Arbuste 2-10 m | | Feuillage vert luisant | Baie rouge | Ombre à mi-ombre Bel arbuste, isolé ou en haie, il se taille très bien. Croissance faible Sol non calcaire |

| | NOM | FLORAISON | FEUILLAGE | FRUICTIFICATION | REMARQUES |
|--|---|--|--|--|--|
| | Néflier <i>Mespilus germanica</i> Arbuste 2-6 m | blanche, grande mai – juin  | vert clair, duveteuses, molles coloration automnale de jaune à rouge brun | nèfle, gros, rouge clair brunâtre. comestible blet. Oct– nov  | Plein soleil Croissance faible Le néflier s'installe dans la haie ou dans le bosquet. Mais c'est isolé qu'il séduit par sa forme, sa floraison, et ses épines. En sol léger, peu humide. |
| | Nerprun purgatif <i>Rhamnus catharticus</i> Arbuste, 3 - 6 m | jaunâtre mai - juin | vert foncé, coloration automnale de jaune à brun clair | petite drupe noire septembre - octobre | Plein soleil Croissance forte Buissonnant, cet arbuste est parfait pour combler la base des haies dégarnies. Ses épines lui assurent un rôle défensif. En terrain calcaire, bien exposé. |
|  | Noisetier <i>Corylus avellana</i> Arbuste, 3-5 m | chaton janvier – mars | couvert plus ou moins épais, coloration automnale de jaune à brun | noisette septembre – octobre, nombreuses variétés cultivées pour les fruits. | Plein soleil, mi-ombre Croissance forte, supporte la taille la plus sévère, mellifère, coupe-vent. Tout type de sol mais de préférence en terrain frais et pas trop acide. Mi ou sommet de berge |
|  | Prunellier, épine noire <i>Prunus spinosa</i> Arbuste, 4 m | blanche avant les feuilles avril | petites feuilles | prunelle bleu noirâtre persistant longtemps août - novembre | Plein soleil, mi-ombre Utilisé dans la constitution de haies vives, défensives (épines). Le prunellier devient vite encombrant. |
|  | Sureau noir <i>Sambucus nigra</i> Arbuste, 3-10 m | blanche ou jaunâtre, odorante juin - juillet | odorant | Grappe de baie noire septembre | Plein soleil à mi-ombre Croissance forte. Cet arbuste propose mille délices aux connaisseurs. Il s'installe dans la haie et dans les bosquets. Taillé, il orne les massifs. De préférence en sol profond et peu acide. Sommet de berge |

| | NOM | FLORAISON | FEUILLAGE | FRUCTIFICATION | REMARQUES |
|--|--|------------------------------------|---|---|--|
|  | Troène <i>Ligustrum vulgare.</i> Arbuste, 1-3 m | blanche, odorante mai - juin | semi persistant, vert mat parfois panaché | baie noire, persistant longtemps septembre | Plein soleil, croissance forte, Avec son feuillage semi persistant, sa floraison blanche parfumée laissant la place à de petites baies noires, le troène compose de superbes haies. Tout type de sol. Bas omni berge |
|  | Viorne lantane ou viorne mancienne <i>Viburnum lantana</i> Arbuste, 1-4 m | blanche, odorante mai - juin | vert clair, grande coloration automnale rouge | baie rouge puis noire à maturité. juillet - septembre | Mi-ombre Croissance forte. En haie et dans les massifs, cette viorne fera merveille avec ses fleurs odorantes, ses baies rouges puis noires et son feuillage devenant d'un rouge intense en automne. En sol calcaire et sec |
| | Viorne obier <i>Viburnum opulus</i> Arbuste, 1-4 m | blanche mai - juin | coloration automnale rouge | baie globuleuse, rouge vif septembre - décembre | Plein soleil. Croissance forte. Une touche de rouge dans le jardin ! Telle est la couleur des baies de cette viorne, et de son feuillage automnal. Pour orner haies et massifs. Parfait pour les sols légèrement acides et humides |